

Tablica 3. Skale za ocjenu depresije (prema godini nastanka)

Originalni naziv	Autor Godina (Referenca)	Način primjene	Broj čestica	Glavno obilježje
Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D)	Hamilton 1960. (31)	Klinički intervju	21 (17)	Kvantificira težinu depresije, nije dijagnostički instrument
Beck Depression Inventory (BDI)	Beck i sur. 1961. (32)	Samoocjenska, s pomoću intervjua	21 (13)	Mjeri dubinu depresije i stoga se rabi kao mjera ishoda liječenja
Newcastle scales	Carney i sur. 1965. (33)	Ocjena liječnika	10	Služi za diferencijalnu dijagnostiku između endogene i reaktivne depresije
Zung Self-Rating Depression Scale (SDS)	Zung 1965. (34)	Samoocjenska skala	20	Može diferencirati depresiju od drugih psihotičnih poremećaja
Middlesex Hospital Questionnaire (MHQ)	Crown i Crisp 1966. (35)	Samoocjenska skala	48	6 supskala koje mjere psihoneurotski status: fobičnu anksioznost, opsesivnost, somatizacije, histeriju i anksioznost
Centre for Epidemiological Studies (CES-D)	Radloff 1977. (36)	Osobni izvještaj	20	Prvostupanjski skrining test za depresiju u epidemiološkim studijama
Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)	Montgomery i Åsberg 1979. (37)	Promatračka ocjenska skala	17	Osjetljiva na promjene u depresivnoj bolesti
Bech-Rafaelsen Melancholia Rating Scale (BRMS)	Bech i Rafaelsen 1980. (38)	Ocjena profesionalca	11	Razvijena iz HAM-D, prednost su specifična sidrišta, tj. opisi težine simptoma
General Practitioner Research Group Depression Scale	Gringas 1980. (39)	Ocjena liječnika	11	Mjeri depresiju u studijama u općoj praksi
Carroll Depression Rating Scale	Carroll i sur. 1981. (40)	Samoocjenska	17	Samoocjenska Hamiltonova skala
Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD)	Zigmond i Snaith 1983. (41)	Samoocjenska	14	Otkrivanje anksioznosti i depresije u medicinskom i kirurškom izvanbolničkom okruženju
Clinical Interview for Depression	Paykel 1985. (42)	Ocjena profesionalca	36	Polustrukturirani intervju sa sidrištim, uključuje depresiju i anksioznost
Daily Self-Rating Scale for Depression (KUSTA)	Wendt i sur. 1985. (43)	Samoocjenska	9	Ocenjuje tijek depresivne bolesti

Tablica 4. Hamiltonova ocjenska ljestvica za depresiju (HAM-D-17)

1. Depresivno raspoloženje <i>(tuga, beznadnost, bespomoćnost, bezvrijednost)</i>	0 Nije prisutno 1 Ovakvo emocionalno doživljavanje iskazano je samo na izravni upit 2 Govorno izražava i bez upita 3 Emocionalno doživljavanje iskazuje neverbalno, tj. zaključuje se iz ponašanja, izrazom lica, držanjem tijela, glasom i sklonosću plaču 4 Bolesnik gotovo isključivo govori o tome u svojoj spontanoj verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji	3 Skraćenje vremena potrošenog na aktivnosti ili smanjenje produktivnosti. U bolnici: ocjena 3 je zaslujaj kada bolesnik nije u stanju provoditi najmanje tri sata na dan u aktivnostima (bolesnička zanimanja ili slobodne aktivnosti i hobiji) izuzev dužnosti na odjelu 4 Prestanak rada zbog sadašnje bolesti. U bolnici: ocjena 4 je ako se bolesnik ne uključuje ni u kakve aktivnosti osim svojih dužnosti na odjelu, ili ako bolesnik ne ispunjava dužnosti na odjelu bez pomoći
2. Osjećaj krivnje	0 Nije prisutan 1 Samopredbacivanje, osjeća da je iznevjerio okolinu 2 Osjećaj krivnje ili stalno razmišljanje o proteklim greškama i propustima 3 Sadašnju bolest smatra kaznom. Sumanutost krivnje 4 Čuje optuživačke ili prijeteće glasove i/ili prisutnost vidnih halucinacija prijetećeg sadržaja	8. Usporenost (psihomotorna inhibicija) <i>(Usporenost misli i govora; smetnje u sposobnosti koncentracije; smanjena motorička aktivnost)</i> 0 Uredni govor i mišljenje 1 Blaga usporenost kod pregleda (razgovora) 2 Očita usporenost kod pregleda (razgovora) 3 Pregled/razgovor izrazito otežan 4 Stupor
3. Samoubilački porivi	0 Nisu prisutni 1 Osjeća da život nema vrijednosti, da nije vrijedan življjenja 2 Želja za smrću ili bilo koje misli o mogućoj smrti 3 Samoubilačke misli ili geste 4 Pokušaji suicida	9. Agitacija 0 Nije prisutna 1 Uznemirenost 2 Igra se rukama, kosom i slično 3 Kreće se unaokolo, ne može mirno sjediti 4 Lomi ruke, grize nokte, čupa kosu, grize usnice
4. Smetnje usnivanja	0 Bez teškoća kod uspavljivanja 1 Žali se na povremene teškoće kod uspavljivanja koje traju dulje od pola sata 2 Žali se na svakodnevne teškoće kod uspavljivanja	10. Anksioznost - psihička (psihički strah) 0 Nije prisutna 1 Unutarnja napetost i razdražljivost 2 Zabrinutost oko sitnica 3 Izraz ustrašenosti u govoru i licu 4 Izražava strah i bez upita
5. Smetnje spavanja (prosnivanja)	0 Nisu prisutne 1 Bolesnik se žali na nemir i isprekidan san 2 Budenje tijekom noći - svako ustajanje iz kreveta dobiva ocjenu 2 (osim u svrhu pražnjenja, dakle ustajanje zbog mokrenja se isključuje)	11. Anksioznost - somatska (tjelesni strah) <i>(Fiziološke popratne pojave anksioznosti, kao što su: gastrointestinalne: suha usta, nadutost, probavne smetnje, proljev, grčevi, podrigivanje; kardiovaskularne: lupanje srca, glavobolje; respiratorne: hiperventilacija, uzdisanje; urinarne: češće mokrenje; znojenje)</i> 0 Nije prisutna 1 Neznatna 2 Umjerena 3 Jaka 4 Onesposobljuje bolesnika
6. Jutarnje smetnje spavanja	0 Nisu prisutne 1 Budi se rano ujutro, ali ponovno zaspi 2 Ne može ponovno zaspasti ako rano ustane iz kreveta (budi se rano bez ponovnog usnivanja)	
7. Rad i aktivnost	0 Nema teškoća 1 Osjeća se nesposobnim, umornim ili slabim kod radnih i slobodnih aktivnosti 2 Gubitak zanimanja za rad i aktivnosti - bilo da je izravno iskazano od strane pacijenta, ili indirektno u nedostatku agilnosti, u neodlučnosti i kolebljivosti (osjećaj da se mora prisiljavati na rad ili aktivnost)	12. Gastrointestinalni simptomi 0 Nisu prisutni 1 Nedostatak apetita, ali jede bez nagovaranja 2 Jede samo uz nagovaranje i nudjenje

13. Opći tjelesni simptomi

- 0 Nisu prisutni
1 Osjećaj težine ili bola u udovima, leđima, glavi.
Gubitak tjelesne snage i lako zamaranje
2 Svaki od gornjih simptoma ako je jako izražen

14. Genitalni simptomi

(kao što je gubitak libida, menstrualni poremećaji)
0 Nisu prisutni
1 Umjereni
2 Jako izraženi

15. Hipohondrijski simptomi

- 0 Nisu prisutni
1 Pojačano tjelesno samopromatranje
2 Zabrinutost za svoje zdravlje
3 Česte pritužbe na smetnje, traženje pomoći itd.
4 Hipohondrijske sumanutosti

16. Gubitak tjelesne težine

(Osoblje gubitak težine bilježi redovito kod tjednog mjerjenja promjena u tjelesnoj težini)
0 Manje od pola kilograma gubitka tjelesne težine u jednom tjednu
1 Više od pola kilograma, ali manje od kilograma gubitka tjelesne težine u tjedan dana
2 Više od kilograma tjelesne težine izgubljeno tijekom tjedan dana

17. Uvid u bolest

- 0 Uviđa (potvrđuje) da je depresivan i bolestan
1 Uviđa bolest, ali je pripisuje lošoj prehrani, klimi, prenapornom radu, infekciji, potrebi za odmorom itd.
2 Potpuno negira bolest

HAM-D-17 ukupni rezultat:

Tablica 5. Montgomery-Åsbergova ocjenska ljestvica za depresiju (MADRS)

1. Uočljiva žalost <p>Predstavlja žalost, malodušnost i očaj (izraženje od uobičajenog prolaznog lošeg raspoloženja) što se odražava u govoru, izrazu lica i držanju tijela. Ocijeniti prema težini i nesposobnosti da se raspoloži.</p> <p>0 Odsutnost žalosti 1 2 Izgleda malodušno, ali se raspoloži bez teškoća 3 4 Izgleda žalosno i nesretno glavninu vremena 5 6 Izgleda mizerno čitavo vrijeme. Ekstremno očajan</p>	5. Smanjeni apetit <p>Predstavlja osjećaj gubitka apetita u usporedbi sa stanjem kada je bolesnik dobro. Ocijeniti prema gubitku želje za hranom ili prema potrebi za prisiljavanjem samog sebe na jelo.</p> <p>0 Normalni ili pojačani apetit 1 2 Neznatno smanjen apetit 3 4 Bez apetita. Hrana je bez okusa 5 6 Potrebna prisila na hranu, odbija hranu</p>
2. Iskazana žalost <p>Predstavlja iskazanu žalost bez obzira na to odražava li se ona na izgled ili ne. Uključuje malodušnost i osjećaj bespomoćnosti i beznadnosti. Ocijeniti prema intenzitetu, trajanju i prema tome u koliko je mjeri iskazano da događaji mogu utjecati na raspoloženje.</p> <p>0 Povremena žalost ovisna o okolnostima 1 2 Tužan, ali se raspoloži bez teškoća 3 4 Sveobuhvatan osjećaj žalosti ili potištenosti. Raspoloženje se još uvijek mijenja pod utjecajem izvanjskih okolnosti. 5 6 Kontinuirana ili nepromjenjiva tuga, mizernost i očaj.</p>	6. Teškoće koncentracije <p>Predstavlja raspon od teškoća sabiranja misli do onesposobljavajućeg gubitka koncentracije. Ocijeniti prema intenzitetu, učestalosti i stupnju nastale onesposobljenosti.</p> <p>0 Bez teškoća koncentracije 1 2 Povremene teškoće sabiranja misli 3 4 Teškoće u koncentraciji i zadržavanju misli što smanjuje sposobnost čitanja ili konverzacije 5 6 Nesposobnost čitanja ili razgovaranja bez velikih teškoća</p>
3. Unutrašnja napetost (anksioznost) <p>Predstavlja osjećaje nejasne nelagodnosti, razdražljivosti, unutrašnjeg nemira, duševne napetosti koja se razvija u panični strah ili tjeskobu. Ocijeniti prema intenzitetu, učestalosti, trajanju, potrebnom stupnju tješenja da bi došlo do smirenja.</p> <p>0 Miran. Samo prolazna unutrašnja napetost 1 2 Povremena razdražljivost i nejasna nelagoda 3 4 Kontinuiran osjećaj unutrašnje napetosti ili intermitentne (povremeno popuštajuće) panike koju bolesnik može kontrolirati samo uz veći napor 5 6 Strah i tjeskoba koji ne popuštaju. Preplavljujuća panika</p>	7. Umor (malaksalost, tromost) <p>Predstavlja poteškoću započinjanja svakodnevne aktivnosti ili usporenost kod njihova izvođenja</p> <p>0 Teškoće u počinjanju aktivnosti gotovo da ne postoje. Nema usporenosti 1 2 Teškoće u počinjanju aktivnosti 3 4 Teškoće u počinjanju jednostavnih rutinskih aktivnosti, koje izvodi uz napor 5 6 Potpuna malaksalost. Nesposobnost da se bilo što učini bez pomoći</p>
4. Smetnje spavanja <p>Predstavljaju skraćeno trajanje ili dubinu spavanja u usporedbi s bolesnikovim normalnim ritmom kada je dobro.</p> <p>0 Spava kao i obično 1 2 Blage teškoće kod usnivanja ili malo skraćeno, plitko ili isprekidano spavanje 3 4 Spavanje skraćeno ili isprekidano za najmanje 2 sata 5 6 Manje od dva ili tri sata spavanja</p>	8. Nemogućnost emocionalnog doživljavanja <p>Predstavlja subjektivno iskustvo smanjenog interesa za okolinu ili aktivnosti koje obično pružaju užitak. Smanjena je sposobnost odgovarajućeg emocionalnog reagiranja prema okolnostima ili ljudima.</p> <p>0 Normalno zanimanje za okolinu i ljude 1 2 Smanjena sposobnost uživanja u uobičajenim interesima 3 4 Gubitak zanimanja za okolinu. Gubitak zanimanja za prijatelje i znance 5 6 Osjećaj emocionalne paralize. Nesposobnost osjećanja ljutnje, boli ili užitka i potpuni ili čak bolni nedostatak emocija prema bližoj rodbini ili prijateljima</p>

9. Pesimističke misli

Predstavlja misli o krivnji, inferiornosti, grižnji savjesti, grešnosti, kajanju i propasti.

- 0 Bez pesimističkih misli
- 1
- 2 Povremene ideje o neuspjehu, grižnji savjesti i samooptuživanju
- 3
- 4 Kontinuirano samooptuživanje ili definitivne, ali još uvijek racionalne, ideje o krivnji ili grijehu. Sve izraženije pesimističko gledanje na budućnost
- 5
- 6 Sumanute misli propasti, kajanja ili nepopravljivog grijeha. Apsurdno i nepokolebljivo samooptuživanje

10. Suicidalne misli

Predstavljaju osjećaj da život nije vrijedan življenja, da bi prirodna smrt dobro došla, suicidalne misli i pripreme za suicid. Pokušaji suicida sami po sebi ne trebaju utjecati na ocjene.

- 0 Uživa život ili ga uzima kakav jest
- 1
- 2 Umoran od života. Prolazne misli o suicidu.
- 3
- 4 Bolje bi bilo biti mrtav. Suicidalne misli su česte, a suicid se smatra mogućim rješenjem, ali uz odsutnost određenih planova ili namjera.
- 5
- 6 Eksplicitni planovi za suicid ako se pruži mogućnost.
Aktivne pripreme za suicid

Ukupni MADRS rezultat: